
	<b>PANDUAN PRAKTIK KLINIS PEMBERIAN CAIRAN PADA PASIEN SYOK DENGAN MALNUTRISI BERAT</b>		
	No Dokumen 445/614/PROGNAS /2022	No Revisi 0	Halaman 1/2
<b>PANDUAN PRAKTIK KLINIS</b>	<b>Tanggal terbit 11 Juli 2022</b>	 <b>Ditetapkan Direktur</b> <b>dr.ELVI FITRANETI, Sp.PD FINANSIM</b> <b>NIP. 19710514 200212 2 002</b>	

<b>PENGERTIAN</b>	Memberikan resusitasi cairan pada anak dengan malnutrisi berat yang mengalami syok, letargis atau terjadi penurunan kesadaran
<b>TUJUAN</b>	Memberikan resusitasi cairan pada anak dengan malnutrisi berat dalam keadaan syok
<b>PROSEDUR</b>	<p>Pada saat anak dengan malnutri berat ditemukan dalam keadaan syok :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan cairan melalui intravena sebanyak 15 mL/kgBB dalam 1 jam, cairan yang dapat diberikan adalah :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringer lactate + D5%</li> <li>• Half-normal saline + D5%</li> <li>• Ringer lactate</li> </ul> </li> <li>- Pantau frekuensi nadi dan respirasi pada saat awal resusitasi dan setiap 5-10 menit ketika resusitasi masih berjalan</li> </ul> <p>Apabila terdapat perbaikan keadaan (yang ditandai dengan berkurangnya frekuensi nadi dan respirasi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan kembali cairan sebanyak 15 mL/kgBB secara intravena dalam waktu 1 jam</li> <li>- Kemudian berikan rehidrasi ReSoMal(secara oral maupun NGT) sebanyak 10 mL/kgBB/jam sampai dengan 10 jam</li> <li>- Memberikan inisiasi feeding dengan F-75</li> </ul> <p>Apabila tidak terjadi perbaikan setelah resusitasi cairan</p>

	<b>PANDUAN PRAKTIK KLINIS PEMBERIAN CAIRAN PADA PASIEN SYOK DENGAN MALNUTRISI BERAT</b>		
	No Dokumen 445/614/PROGNAS /2022	No Revisi 0	Halaman 1/2
<b>PANDUAN PRAKTIK KLINIS</b>	<b>Tanggal terbit 11 Juli 2022</b>	 <b>Ditetapkan Direktur</b> <b>dr.ELVI FITRANETI, Sp.PD FINANSIM</b> <b>NIP. 19710514 200212 2 002</b>	

	sebanyak 15 mL/kgBB/1 jam : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berikan cairan intravena maintenance (4 mL/kgBB/jam) sambil menunggu transfusi darah</li> <li>- Ketika darah sudah tersedia, berikan transfusi FWB sebesar 10 ml/kgBB dalam waktu 3 jam (apabila terjadi gagal jantung, berikan PRC.</li> <li>- Berikan terapi antibiotik</li> </ul>
<b>UNIT TERKAIT</b>	SMF Anak Ruang Intensif Anak (PICU) Instalasi Gizi
<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	Pocket book of Hospital Care for Children. WHO. 2005